

ÖRNEK SORULAR

1 .Aşağıdakilerden hangisi nükleozid/nükleotid revers transkriptaz inhibitörü(NRTI) ilaçlardan biridir?

- a. Lopinavir
- b. Elvitağravir
- c. Darunavir
- d. Tenofovir**
- e. Nevirapin

2.Aşağıdaki infeksiyonlardan hangisi için solunum yolu izolasyonu gerekmez?

- a. Kızamık
- b. Tüberküloz
- c. Listeriyoz**
- d. SARS
- e. Dissemine zoster

3.Doğurganlık çağındaki kadınlarda hastane dışında gelişen akut sistitin en sık etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

- a. ***Escherichia coli***
- b. *Proteus mirabilis*
- c. *Staphylococcus epidermidis*
- d. *Pseudomonas aeruginosa*
- e. *Neisseria gonorrhoeae*

4.Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisine tigesiklin düşük etkili/ya da etkisizdir?

- a. *Hemophilus influenzae*
- b. Metisiline dirençli *Staphylococcus aureus*
- c. Vankomisine dirençli enterokok
- d. *Pseudomonas aeruginosa***
- e. ESBL üreten *E. coli*

5.Plazmodyum türlerinin kanda görülen, çekirdeği bölünmüş, olgun formuna ne isim verilir?

- a. Sporozoit
- b. Halka (ring) formu
- c. Şizont**
- d. Merozoit
- e. Gametosit

6.Stafilokok türlerinin tiplendirilmesinde aşağıdaki testlerden hangisinin anlamı yoktur?

- a. Koagülaz testi
- b. Fosfataz aktivitesi
- c. Katalaz testi**
- d. Novobiosin direnci
- e. Termonükleaz testi

7.Sekonder peritonitli hastalarda en sık etken olan mikroorganizma çifti aşağıdakilerden hangisidir?

- a. Enterokoklar, kandida türleri
- b. *E coli*, *B.fragilis***

- c. *S.epidermidis*, *E.coli*
- d. *Pseudomonas* spp., *Aspergillus* spp.
- e. Peptostreptokoklar, enterokoklar

8.Sifiliz sırasında hasarlanan vücut hücrelerinden açığa çıkan lipidlere karşı oluşan antikorlara ne ad verilir?

- a. Heterofil antikorlar
- b.Reagin antikorlar**
- c. Blokan antikorlar
- d. Aglütininler
- e. Monovalan antikorlar

9.Aşağıdaki brüselloz komplikasyonlarından hangisi genellikle cerrahi tedavi gerektirir?

- a. Bursit
- b. Artrit
- c. Spondilodiskit
- d. Endokardit**
- e. Menenjit

10. Kırk altı yaşındaki erkek hasta göğsünde bir noktada aniden ortaya çıkan ağrı ve titreyerek 39°C'ye yükselen ateş nedeniyle başvuruyor. Öyküsünden 20 yıldır günde bir paket sigara içtiği ve alkolik olduğu öğreniliyor. Fizik muayenede göğsün sağ alt tarafında matite ve krepitan raller saptanıyor. Amoksisilin/klavulanat 4x1 gr/gün başlıyor. Bu tedaviyle ateşi düşmeyen, bilinç değişikliği ve ishali de olan hastanın akciğer grafisinde yama tarzında çoklu infiltrasyon gözlenmiştir. Balgam ve kan kültürleri negatif olan hastanın en muhtemel tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

- a. Aspirasyon pnömonisi
- b. Legionella pnömonisi**
- c. Viral pnömoni
- d. Pnömonokok pnömonisi
- e. Mantar pnömonisi