

BİBER GAZI TEDAVİ KLAVUZU



Hekimlerin Sosyal Medya Platformu
facebook.com/asistanhekim



BİBER GAZI TEDAVİSİ

HASTANE ÖNCESİ İLK MÜDAHALE

1. Hastaya müdahale ederken mutlaka kendinizi koruyun. Biber gazı ile doğrudan temas hastaya müdahale edeni de etkileyebilir.
2. Bulabilerseniz, maske ve eldivenle müdahale sırasında size tesir edecek gaz etkisini minimale indirin.
3. Öncelikle bebeklere, çocuklara, yaşlılara ve astım hastalarına müdahale edin. Duyarlı gruplar biber gazından daha çok etkilenir.
4. Hastayı biber gazına maruz kaldığı ortamdan çıkarın.
5. Hastanın üzerindeki giysileri ivedilikle çıkarın.
6. Hastanın varsa gözündeki kontak lensleri çıkarın.
7. Hastaya müdahale ederken (dekontaminasyon sırasında) biber gazının acı verici etkisinin artacağı konusunda hastaya bilgi verin.
8. Hastanın gözlerini bol çeşme suyu ile yıkayın.
9. Hastanın derisini bol sabunlu suyla yıkayın ve ardından çeşme suyu ile durulayın.
10. Hastanın ağrısının giderilmesi için anestol tarzı lokal anestezikler kullanın.
11. Hastanın derisine bulaşmış gaz kalıntısını bulabilerseniz zeytinyağı vb. bitkisel yağlarla temizleyin.
12. Hastaya müdahale ederken mutlaka kendinizi koruyun. Biber gazı ile doğrudan temas hastaya müdahale edeni de etkileyebilir.

Notlar:

- a) Biber gazının antioksidanı yoktur. Tedavi semptomatik ve destekleyicidir.
- b) Asla hipoklorit kullanmayın!

- c) Limonun biber gazı üzerine kanıtlanmış bir etkisi yoktur. İçindeki su sebebiyle acil müdahalede kısmi fayda göstermektedir.

SAĞLIK BİRİMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK MÜDAHALE

1. Müdahale edecek hastane personeli koruyucu giysiler giymeli ve kendisini mesleki kazalardan korumalıdır.
2. Sağlık biriminin bir alanı sadece bu hastalara ayrılmalıdır.
3. Hastaların gözlerini bol suyla ve izotonik NaCl ile yıkayın.
4. Gözlerdeki kalıntıları temizledikten göz hekimini olası kornea abrazyonları için konsültasyona davet edin.
5. Vakaların %1'i yoğun müdahale gerektirir, hazırlıklı olun.
6. Korneal abrazyonların tedavisi için lokal antibiyotikler, oral analjezikler ve yakın takip gereklidir.
7. Solunumsal şikayetleri olan hastalara kısa etkili bronkodilatatörler (ventolin, combivent vb.) ile müdahale edin. (içerisinde salbutamol olmalı). Durumu ağırlaşanları yoğun bakım ünitesine alın.

tüm sorularınız için info@asistanhekim.org



Hekimlerin Sosyal Medya Platformu
facebook.com/asistanhekim