



GEBELİK ve HEPATİT B

Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR



TAKIP

TEDAVI

KLAVUZLAR
???

* Karaciğer
hastalığının
seviyesi

*Teratojenite
*İntrauterin
geçiş

Anne

Bebek



***OLGU (İMMUNTOLERAN FAZ)

- 25 yaşında
- 16 haftalık gebe
- Takipli hasta
- HBsAg (+), HBeAg(+), HBV DNA: 1001000000 IU/mL
- ALT:15-20 u/l

Kardeşi ileri evre karaciğer hastası



- Borgia ve ark. HBV DNA seviyesinin 10^6 copy/ml üzerinde

Borgia G, World Journal of Gastroenterology 2012;34:4677-83.

- Bzovej, HBV DNA seviyesinin 10^6 copy/MI (200.000 IU/mL) üzerinde

Bzowej NH. Curr Hepatitis Rep 2012;11:82-9.

- Piratvisuth HBV DNA seviyesinin 10^6 copy/ml (200.000 IU/ ml) üzerinde

Piratvisuth T. Liver International 2013;188-94.

•Önceki çocuk HBsAg
pozitif ise 10^6 copy/ml

•Önceki çocuk HBsAg
negatif ise 10^{8-9} copy/ml

Gebelikte Hepatit B tedavisi

Tenofovir
Telbuvidin
(B)

Entekavir
Adefovir
(C)

Lamivudin
Deneyim fazla
(C)

İnterferon
kontrendike

Gebelikte Hepatit B tedavisi

Tenofovir tedavisi başlandı.



***OLGU (KHB)

- 30 yaşında
- 26 haftalık gebe
- HBsAg (+), HBeAg (+),
- HBV DNA > 10⁸ copy/ml
- ALT:214 u/l, AST:186 u/l.



Gebelikte Hepatit B tedavisi

Tenofovir tedavisi başlandı.



Dođum sonrası biyopsi Evre:3, HAI:10
tedaviye devam edildi..





***OLGU (TEDAVİ ALIRKAN GEBE KALAN)

- 35 yaşında infertil bayan hasta
- HBs Ag (+), HBe Ag (+) , ALT:94-110 u/l,
- HBV DNA: 11850000000 IU/ml,
- Fibrozis:4, HAI:11
- Entecavir 0,5 mg/gün başlandı.

Tedavi 11. ay
ALT:10u/l,
HBV DNA:65 IU/mL,
HBeAg (+)
B-HCG 17090 mIU/mL



Gebelikte KHB Tedavisi



Gebelikte Hepatit B tedavisi



Onam
Formları

- Hasta kendi isteđi ile tedaviyi kesti.
- Hasta aylık takip edildi.
- Annenin ALT ve HBV DNA seviyesi tedrici olarak yükseldi
Dođum sonrası 8. ayda (ALT:84u/l,
HBV DNA:>10⁵IU/mL,
tedaviye tekrar başlandı.



Doğum anı;

- Sezeryan ve normal doğum arasında fark yok.
- Sezeryan önerilmiyor!

Wang J Chin Med J (Engl) 2002; 115: 1510-2.
Saltoğlu N.. Viral hepatit 2013. (Edt. Tabak F, Tosun S).





- Aşı
- İmmunglobilin

ÖNEMLİ!

ÖNERİLİR

Günümüzde annenin antiviral tedavi alırken emzirmesi ile ilgili çalışmalar azdır.

***Tedavinin kesilmesi veya emzirmemesi önerilmektedir.

Herşey gönlünüzce olsun...



Sayın VHÇG Üyeleri,

Tenofovir ve entekavir alan Kronik Hepatit B hastalarında 5 yıllık tedavi etkinliklerini karşılaştırmak için bir çalışma planladık. Hasta verileri ile ilgili excel dosyaları ekte verilmiştir.

15 Eylül 2013 tarihine kadar ekteki excel dosyasına girerek gönderebilirseniz VHÇG ait çok merkezli bir çalışma daha tamamlamış olacaktır.

Yanıtlarınızı bekliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla

Onur Ural, Nazlım Aktuğ Demir, Şua Sümer

16.08.2013

