

Yozgat il ve ilçe devlet hastaneleri acil servislerine kene teması ile başvuran hastaların değerlendirilmesi

Fatih Temoçin¹, Hatice Köse¹, Tuğba Sarı², Necla Tülek³

1-Yozgat Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Yozgat

2- Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Denizli

3- Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Giriş ve Amaç

- Keneler pek çok patojen etkeni taşıyabilir. Bu etkenlerden biri de, Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA)'ne neden olan KKKA virüsüdür.
- KKKA, %5-30 mortalite ile seyreden bir hastalıktır. Türkiye'de ilk kez 2002 yılında rapor edilen KKKA vakasının ardından, ülkemizde vakalar endemik olarak görülmeye devam etmektedir.
- Çalışmamızda amaç; KKKA hastalığının endemik olarak görüldüğü Yozgat'ın, merkez ve ilçe devlet hastaneleri acil servislerine, kene teması ile başvuran hastaları incelemek, KKKA gelişme oranını saptamaktır.


Gereç ve Yöntem

- 2015 yılında, kene temasıyla merkez ve ilçe devlet hastanelerinin acil servislerine başvuran tüm hastaların kayıtları incelendi.
- Hastaların demografik özellikleri ve kenenin tutunduğu vücut bölgesi kaydedildi. Ayrıca tüm il genelinde kene tutunmasıyla başvuran, kesin KKKA tanısı alan ve KKKA'dan ölen hastalar değerlendirildi.


Bulgular

- Çalışma süresince Yozgat ilindeki tüm devlet hastanelerine başvuran kene temaslı hasta sayısı 2686 idi.
- Temaslı hastaların 1512 (%56,2)'si erkek, 1174 (%43,7)'si kadındı.
- Çalışma süresince 57 hasta KKKA tanısı aldı ve 3 hasta hayatını kaybetti.






2015 yılında kene teması ile acil servise başvuran hastaların ve KKKA pozitif saptanan hastaların coğrafi dağılımı



Yıllara göre kene teması ile acil servise başvuran ve KKKA pozitif saptanan hastalar



- Kene teması en sık alt ekstremitede (%39,7) ve en sık Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında görüldü.

Tartışma

- Ülkemizdeki KKKA olgularının büyük kısmında kene tutunma öyküsü bulunmaktadır. Çalışmamızda da vakalarımızın çoğunluğunda kene temas öyküsü vardı.
- Yıllar içerisindeki dağılım dikkate alındığında, zamanla kene teması ile acil servislere başvuran hasta sayısının azaldığı ve buna paralel olarak KKKA hastalığının da azaldığı görülmektedir.
- Bu azalma; yapılan bilgilendirme çalışmalarının, kene popülasyonunu azaltmaya yönelik yapılan çalışmaların bir sonucu olabilir.

- Bu çalışmada da diğer çalışmalara benzer olarak erkeklerde kene temasının daha fazla olduğu görülmüştür.
- Bunun nedeninin erkeklerin tarım ve hayvancılık işlerine daha aktif katılmaları olabileceği düşünülmüştür.

- Tarım ve hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı bölgeler KKKA hastalığının sık görüldüğü bölgelerdir.
- Bu çalışmada da diğer çalışmalara benzer şekilde kırsal alanda yaşama öyküsü olan hasta sayısı, il ve ilçe merkezinden gelen hasta sayısına göre yüksek bulunmuştur.

- Bu sonuçlar, KKKA hastalığı ile mücadelede, kene popülasyonunu azaltmaya ve kene tutunmasından korunmaya yönelik çalışmaların önemine dikkat çekmektedir.
- Ülkemizde halen olguların saptanması nedeniyle, kişisel korunma önlemlerine, sağlık personelinin hizmet içi eğitimine ve halka yönelik bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam edilmelidir.

KLİMİK 2016 - 30. YIL KURULTAYI

09 – 12 Mart 2016

Cornelia Diamond Golf Resort & Spa – Belek / Antalya

Dinlediğiniz için teşekkürler