

# BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ HASTADA BAĞIŞIKLAMA

Uzm. Dr Gülçin TELLİ DİZMAN

Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları

# OLGU-1

- ▶ 38 yaşında bayan
- ▶ Sağlık çalışanı
- ▶ Ailevi akdeniz ateşine bağlı amiloidoz tanısı mevcut
- ▶ Hipertansiyon ve kalp yetmezliği gelişmiş
- ▶ Kolşisin, ramipril ve metoprolol kullanıyor
- ▶ Diğer tedavilere yanıt alınamayan hastaya bir interlökin reseptör antagonisti olan anakinra 100 mg /gün eklenmiş
- ▶ **Tedavi öncesinde aşılama açısından değerlendirilmemiş!**
- ▶ Tedavinin 7. ayında konjuge pnömokok aşısı(PCV13) yapılmış
- ▶ Bu aşılamadan 2 ay sonra polisakkarit aşısı (PPSV23) uygulanmış
- ▶ İkinci aşılama sırasında anafilaksi gelişmiş
- ▶ **Hastanın sorusu:** Tekrar aşı yaptırmalı mıyım? Hangi aşıları ne zaman yaptırmalıyım?

# SORULAR



- ▶ FMF tanısı konduktan sonra sadece kolşisin ile tedavi edilirken aşılama açısından değerlendirme gerekli mi ?
- ▶ Anakinra tedavisi öncesi aşılama açısından değerlendirme gerekli mi? Hangi aşılar ne zaman yapılmalı?
- ▶ Anakinra gibi biyolojik ajanlarla tedavi başlandıktan sonra aşılama açısından danışılan hastalara nasıl bir plan çizilmeli?
- ▶ Bu gibi tedaviler altında yapılan aşıların etkinliği yeterli midir?
- ▶ Pnömonokok aşıları sonrası anafilaksi gelişme riski ve gelişebilecek diğer yan etkiler nelerdir?

# Olgu-2

- ▶ 29 yaşında erkek
- ▶ Sınıf öğretmeni
- ▶ 8 yıl önce travma nedeni ile acil splenektomi öyküsü mevcut
- ▶ Okulda su çiçeği vakaları görülmesi üzerine sağlık çalışanı bir yakını tarafından bir sağlık merkezine yönlendiriliyor
- ▶ **Splenektomi sonrasında aşılama hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapılmamış. Yalnızca 5 yılda bir zatüre aşısı olması gerektiği söylenmiş!**
- ▶ Su çiçeği geçirme öyküsü yok
- ▶ Yapılan tetkiklerinde Varisella-Zoster virüs (VZV) Ig G sonucu negatif geliyor
- ▶ **Hastanın Sorusu:**Korunmak için ne yapmalıyım?

# SORULAR



- Splenektomi öncesi, veya bu tür acil vakalarda splenektomi sonrasında aşılamaya ne zaman başlanmalıdır? Hangi aşılar yapılmalıdır?

# OLGU-3

- ▶ 35 yaşında kadın
- ▶ Sağlık çalışanı
- ▶ 5 aylık gebe
- ▶ **Gebelik/ sağlık çalışanı aşılması kapsamında yapılan influenza aşısını yaptırmak istememiş!**
- ▶ 3 yaşındaki oğluna yüksek ateş ve öksürük nedeni ile değerlendirildiği merkezde influenza tanısı ile oseltamivir tedavisi başlanmış ( alınan boğaz sürüntü örneğinde Influenza A tespit edilmiş)
- ▶ **Hastanın Sorusu:**Korunmak için ne yapmalıyım?Aşı mı olmalıyım yoksa oseltamivir profilaksisi mi almalıyım ?

# SORULAR



- ▶ Gebelerde grip aşısı ne zaman yapılmalıdır?
- ▶ Aşı yaptırmamış gebelerde böyle bir temas sonrası ne yapılmalıdır?
- ▶ Gebelerde yapılması gerekli olan ve yapılmaması gereken aşılar nelerdir?

# OLGU- 4

- ▶ 57 yaşında erkek hasta
- ▶ Kolon adenokarsinomu tanısı almış
- ▶ Acil cerrahi müdahale yapılmış
- ▶ 5 FU kemoterapisi planlanıyor
- ▶ Toplam 6 kür kemoterapi verilecek
- ▶ **Hastanın Sorusu:** Hangi aşıları ne zaman yaptırmalıyım?


# SORULAR



- ▶ Malignitesi olup immünsupresif tedavi alan alan hastalarda hangi aşılar ne zaman yapılmalıdır?

# OLGU-5 (Dr.Umut Kalyoncu)

- ▶ 76 Yaşında erkek
- ▶ 2011 yılında romatoid artrit tanısı konmuş
- ▶ Etanersept, hidroksiklorokin +düşük doz steroid
- ▶ 2012 yılında Rituksimab+leflunomid tedavileri almış
- ▶ Altta yatan koroner arter hastalığı ve sigara kullanma öyküsü mevcut
- ▶ Rituksimab 2. doz için başvurusunda;
  - Hipoksi, halsizlik,sağda solunum seslerinde azalma,
  - Akciğer grafisi: Sağ spontan pnömotoraks, hava–sıvı seviyesi veren görünüm
- ▶ Göğüs tüpü takılıyor ve Piperasilin/Tazobaktam başlanıyor
- ▶ Kan Kültürü:



# OLGU-6

- ▶ 63 Yaşında erkek
- ▶ Sjögren tanısı mevcut
- ▶ İmmünsüpresif tedavi alıyor
- ▶ Grip aşısı yapılmış
- ▶ **Hastanın sorusu:** Pnömoni aşılarını ne zaman yaptırmalıyım ?

# SORULAR



- ▶ Romatizmal hastalığı olup immünsupresif tedavi alan hastalarda aşılama nasıl olmalıdır?
- ▶ Aşılar altta yatan hastalığı alevlendirir mi?



*TEŞEKKÜRLER....*