

HIZLANAN EPİDEMİYE DAHA İYİ NASIL CEVAP VEREBİLİRİZ?

Dr. Aygen Tümer

Hacettepe Üniversitesi HIV/AIDS
Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM)

15-18 Kasım 2018
HIV/AIDS Asistan Okulu - Ankara

TÜRKİYE HIV/AIDS EPİDEMİYOLOJİSİ

Prevalans düşük (<%1) olmasına karşın insidans yıllar içinde artmaktadır

1998 – 2002 yılları arası toplam vaka	784
2003 – 2007 yılları arası toplam vaka	1416
2008 – 2012 yılları arası toplam vaka	3407
2013 – 2017 yılları arası toplam vaka	11253

SON 5 YILDA %300 ARTIŞ
SON 10 YILDA %620 ARTIŞ

HIZLANAN EPİDEMİYE NASIL CEVAP VEREBİLİRİZ-1

- Örgün ve yaygın eğitimde cinsel sağlık eğitimi ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla ilgili bilgiler yaşa göre yeterli düzeyde yer almalı

HIZLANAN EPİDEMİYE NASIL CEVAP VEREBİLİRİZ-2

- HIV testi düşük risk gruplarında değil özellikle «zor ulaşılan gruplara» yönelik yapılmalı
- Sağlık Merkezleri dışında Anonim Test Merkezleri ve Gönüllü Test ve Danışmanlık Merkezleri yeterli sayıda, kalitede ve ulaşılabilir olmalı
- Testlerin aynı kişiye değişik laboratuvarlarda çok sayıda yapılmasının önüne geçilmeli

HIZLANAN EPİDEMİYE NASIL CEVAP VEREBİLİRİZ-3

- Kondom kullanımını teşvik edecek ulusal eğitimler, kampanyalar yapılmalı
- Hem erkek kondomları hem kadın kondomları uygun fiyatta ve kolay ulaşılabilir olmalı

HIZLANAN EPİDEMİYE NASIL CEVAP VEREBİLİRİZ-4

- Sivil Toplum Kuruluşları Hükümet ile daha sıkı çalışmalı, güçleri artırılmalı
- STK'ların maddi gücü desteklenmeli

HIZLANAN EPİDEMİYE NASIL CEVAP VEREBİLİRİZ-5

- HIV ile yaşayanlara yönelik ayrımcılığın, dışlanmanın önlenmesi için eğitimler, bilgilendirmeler yapılmalı

HIZLANAN EPİDEMİYE NASIL CEVAP VEREBİLİRİZ-6

- ***ZOR ULAŞILAN GRUPLARA ERİŞİLMELİ***
 - Seks çalışanları
 - Damar içi madde kullanıcıları
 - MSM'ler
 - Transgender kadınlar
 - Seks çalışanlarının müşterileri ve müşterilerin cinsel partnerleri
 - Geri kalan popülasyon

NEREDEN BAŐLANMALI?

- Sürveyans Sistemi
- HIV infeksiyonundan korunma yollarına (erkek kondomu, kadın kondomu ..) kolay erişilmeli
- Zor ulaőılan gruplara HIV testi için ve tanı konmuş olanlara takip/tedavi için ulaőılmalı
- Tüm HIV infekte kişilere ulaőıp tedavinin %100 ulaőılabilir olması sağlanmalı

