

Desteklenen her iyi fikir, **HAYATI DEĞİŞTİRİR**

Gilead ile **Hayat Bulan Fikirler** Programı'nın amacı HIV, Hepatit B ve C, NASH (non alkolik steatohepatit), İnvaziv Fungal Enfeksiyonlar ve Hematolojik Maligniteler alanlarında;

- ✓ Hastalıkların taranmasını,
- ✓ Teşhis edilmesini ve/veya
- ✓ Uygun tedavilere ulaşılmasını

iyileştirmeye yönelik **en iyi uygulamaların ve yeni fikirlerin** geliştirilmesini, keşfedilmesini ve yayılmasını sağlayacak bilimsel veya sosyal sorumluluk projelerine destek vermektir.

2019 yılında verilecek destek tutarları:

- Bilimsel projeler için toplam : 250.000 TL
- Sosyal projeler için toplam : 150.000 TL



Başvurular 11 Şubat 2019 itibariyle kabul edilmeye başlamıştır.


Son Başvuru Tarihi: 31 Mayıs 2019

Gilead ile **Hayat Bulan Fikirler** Programı hakkında
detaylı bilgi için; www.hayatbulanfikirler.com

Gilead Sciences İlaç Tic. Ltd. Şti.

AND Plaza - İçerenköy Mh. Umut Sk. No:10/12 K:21 34752 Ataşehir-İstanbul

Tel: +90 216 559 0300





Genvoya®

elvitegravir 150mg/kobisistat 150mg/emtrisitabin
200mg/tenofovir alafenamid 10mg tablet

ETKİLİLİK

UYUM


TOLERABİLİTE

KOLAYLIK

**GELECEĞE
TAŞIYAN GÜÇ**

NAİF HASTALARDA RUHSAT ÇALIŞMALARI*

**Türkiye’de ruhsatlanmış ilaçların, 2004-2016 arasında yayınlanmış ruhsat çalışmalarını içermektedir direk karşılaştırma değildir.*



TEDAVİ DENEYİMSİZ HASTALAR İÇİN ÖNERİLEN TEDAVİLER¹

Tablo 4.1. Daha önce ART almamış, erişkin HIV pozitif bireyler için birinci basamak ART rejimi

A) Önerilen rejimler^{1,2}

Rejim	Doz	Uyarı	Gıda Gereksinimi
-------	-----	-------	------------------

2 Nükleosit analogu revers transkriptaz inhibitörü + İntegraz inhibitörü

ABC/3TC/DTG ^{1,2}	ABC/3TC/DTG 600/300/50 mg Günde 1 tablet	» Al/Ca/Mg içeren antasit ve multivitaminler ile eş zamanlı alınmamalıdır (en az 2 saat önce veya 6 saat sonra alınabilir). » Rifampisin ile birlikte kullanılacaksa DTG 50 mg günde iki kez önerilir.	Yok
TAF/FTC/BIC ³	TAF/FTC/BIC 25/200/50 mg Günde 1 tablet	Ağır karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.	Yok
TAF/FTC ³ veya TDF/FTC ³ + DTG	TAF/FTC 25/200 mg Günde 1 tablet TDF/FTC 300/200 mg Günde 1 tablet DTG 50 mg Günde 1 tablet	» Al/Ca/Mg içeren antasit ve multivitaminler ile eş zamanlı alınmamalıdır (en az 2 saat önce veya 6 saat sonra alınabilir). » Rifampisin ile birlikte kullanılacaksa DTG 50 mg günde iki kez önerilir.	Yok
TAF/FTC/EVG/c ³ veya TDF/FTC/EVG/c ^{3,4}	TAF/FTC/EVG/c 10/200/150/150 mg Günde 1 tablet veya TDF/FTC/EVG/c 300/200/150/150 mg Günde 1 tablet	Al/Ca/Mg içeren antasit ve multivitaminler ile eş zamanlı alınmamalıdır (en az 2 saat önce veya 6 saat sonra alınabilir).	Yemekle
TAF/FTC ³ veya TDF/FTC ³ + RAL	TAF/FTC 25/200 mg Günde 1 tablet veya TDF/FTC 300/200 mg Günde 1 tablet RAL 400 mg Günde iki defa 1 tablet veya RAL 600 mg Günde bir defa 2 tablet	» Al/Mg içeren antasitlerle eş zamanlı alınması önerilmez. » Rifampisin ile birlikte kullanılacaksa RAL 400 veya 800 mg günde iki kez alınmalıdır.	Yok

2 Nükleosit analogu revers transkriptaz inhibitörü + Nonnükleosit revers transkriptaz inhibitörü

TAF/FTC/RPV ³ veya TDF/FTC/RPV ³	TAF/FTC/RPV 25/200/25mg Günde 1 tablet veya TDF/FTC/RPV 300/200/25 mg Günde 1 tablet	» CD4 T lenfosit sayısı >200 hücre/mm ³ ve HIV RNA düzeyi <100.000 kopya/mL ise kullanılabilir. » PPI kontrendikedir. H2 antagonistleri, RPV'den 12 saat önce ve 4 saat sonra alınabilir.	Yemekle
--	---	---	---------


2 Nükleosit analogu revers transkriptaz inhibitörü + Güçlendirilmiş proteaz inhibitörü

TAF/FTC ³ veya TDF/FTC ³ + DRV/c(v) veya DRV/r(v)	TAF/FTC 10/200 mg Günde 1 tablet veya TDF/FTC 300/200 mg Günde 1 tablet DRV/c 800/150 mg Günde 1 tablet veya DRV 800 mg Günde 1 tablet ve RTV 100 mg Günde 1 tablet	Sülfonamid alerjisi olan hastalar izlenmelidir.	Yemekle
---	--	--	---------

GENVOYA® 3. YILDA E/C/F/TDF'YE KIYASLA İSTATİSTİKSEL OLARAK DAHA ÜSTÜN ETKİLİLİK SAĞLAR^{1,2}

Tedavi deneyimsiz hastalar
N=1733
t=144 hafta

Virolojik başarı* oranları



Gerçek Yaşam Çalışması



12.
ay

TAFNES KOHORTU
Tedavi Deneyimsiz Hastalar
(n=100)³


*HIV RNA <50 kopya/mL

Referans: 1. Arribas JR, et al. J Acquir Immune Defic Syndr 2017; 75:211-218. 2. Arribas J et al. Poster presented at CROI 2017, February 13-16, 2017 Seattle, WA. Poster #453. 3. Ansgar R et al. Poster presented at 16th European AIDS Conference, 25-27 October 2017, Milan, Italy. PE9/13.

GENVOYA® 2. YILDA FTC/TDF TEMELLİ TEDAVİYE KİYASLA İSTATİSTİKSEL OLARAK DAHA ÜSTÜN ETKİLİLİK SAĞLAR^{1,2}

Tedavi deneyimli
hastalar
N=1436
t=96 hafta

Virolojik başarı* oranları



Gerçek Yaşam Çalışması



12.
ay

TAFNES KOHORTU
Tedavi Deneyimli Hastalar
(n=137)³

*HIV RNA <50 kopya/mL

Ref.: 1. Mills A, et al. Lancet Infect Dis 2016; 16(1): 43–52. 2. DeJesus E et al. AIDS Res Hum Retroviruses. 2018 Jan 25. doi: 10.1089/AID.2017.0203. [Epub ahead of print]. 3. Ansgar R et al. Poster presented at 16th European AIDS Conference, 25-27 October 2017, Milan, Italy. PE9/13.

F/TAF TEMELLİ OMURGA VE İNTEGRAZ İNHİBİTÖRÜ İÇEREN İLK TEK TABLET REJİMİ¹



Farklı hasta profillerinde
yüksek virolojik yanıt²⁻⁵



Daha iyi
Kemik mineral yoğunluğu²⁻⁴



HBV/HCV koenfekte
hastalarda kullanılabilir⁶



Gerçek yaşam koşullarında
korunan yüksek etkililik⁷



CrCl ≥ 30 mL/dk olan
adolesan ve erişkinlerde
kullanılabilir¹



Tedavi öncesinde
test gerektirmez¹



Daha iyi
renal güvenlik²⁻⁴



Hafif-orta karaciğer
yetmezliği olan
hastalarda kullanılabilir¹



KV risk ile
ilişkili değildir¹

Genvoya

elvitegravir 150mg/kobisistat 150mg/emtricitabin
200mg/tenofovir alafenamid 10mg tablet

**GELECEĞE
TAŞIYAN GÜÇ**

1. Genvoya kısa ürün bilgisi, 26 Eylül 2017.

2. Arribas J, et al. J Acquir Immune Defic Syndr 2017; 75(2): 211–218.

3. DeJesus E et al. AIDS Res Hum Retroviruses. 2018 Jan 25. doi: 10.1089/AID.2017.0203. [Epub ahead of print].

4. Post F et al. J Acquir Immune Defic Syndr 2017;74:180–184.

5. Huhn GD et al. J Acquir Immune Defic Syndr. 2017 Feb 1; 74(2): 193–200.

6. Gallant J, et al. JAIDS 2016;73:294–298.

7. Ansgar R et al. Poster presented at the 16th European AIDS Conference, 25-27 October 2017, Milan, Italy. PE9/13.

▼ Bu ilaç ek izleme tabiidir.



Genvoya®

elvitegravir 150mg/kobisistat 150mg/emtrisitabin
200mg/tenofovir alafenamid 10mg tablet

ETKİLİLİK

UYUM

TOLERABİLİTE

KOLAYLIK

**GELECEĞE
TAŞIYAN GÜÇ**