

KLİMİK DERNEĞİ'NDEN OMİKRONA KARŞI BAĞIŞKLAMA ÖNERİLERİ TABLOSU

SinoVac primer aşı şeması: 0, 1 ve 4. aylarda üç doz

BioNTech primer aşı şeması: 0 ve 1. aylarda iki doz

Primer aşı şeması yarım kalan kişilerin aşılamalarına kaldıkları yerden devam edilmesi, hatırlatma dozlarının primer şemanın tamamlanmasından en erken 3 ay sonra yapılması önerilir.

Öneri #	Kişinin Durumu	0. AY	1. AY	2. AY	3. AY	4. AY	5. AY	6. AY	7. AY
1	AŞISIZ	BioNTech	BioNTech			BioNTech			
13	AŞISIZ (immünsüpresif)	BioNTech	BioNTech	BioNTech			BioNTech*		
4	İki doz BioNTech				BioNTech				
5	Üç doz SinoVac				BioNTech				
6	İki doz SinoVac + Bir doz BioNTech				BioNTech				
7	İki doz SinoVac + iki doz BioNTech							BioNTech	
7	İki doz SinoVac + iki doz BioNTech (>65y, immünsüpresyon, altta yatan hastalık, sağlık çalışanı)				BioNTech				
8	Hastalık sonrası iki doz BioNTech							BioNTech	
9	Hastalık sonrası iki doz SinoVac				BioNTech				
10	İki doz SinoVac sonrasında COVID-19				BioNTech			BioNTech	
11	İki doz BioNTech sonrasında COVID-19				BioNTech				
12	Aşısız/eksik aşılyken COVID-19		BioNTech	BioNTech					
Biontech Uygulanamayan Durumlar (Aşıya erişmede güçlük, aşı içeriğine anafilaktik tipte alerjik yanıt, kişinin tercih etmemesi)**									
2	AŞISIZ	SinoVac/Turkovac	SinoVac/Turkovac			SinoVac/Turkovac			SinoVac/Turkovac
10	İki doz SinoVac sonrasında COVID-19				SinoVac/Turkovac	SinoVac/Turkovac			SinoVac/Turkovac
12	Aşısız/eksik aşılyken COVID-19		SinoVac/Turkovac	SinoVac/Turkovac			SinoVac/Turkovac		

* Bağışıklık yetmezliği olan kişilerin inaktif aşı yerine mRNA aşıları ile aşılanmaları önerilir. Bu kişiler 1 ay arayla 3 dozdan (BioNTech) oluşan primer aşı şemasını tamamladıktan sonra ek dozların sayısı ve zamanlamasının belirlenmesi için İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına başvurmaları önerilir

** Ülkemizde üretilen Turkovac aşısına, yapılan FazIII çalışmasının ara sonuçları, bilim insanlarından oluşan bir komitede değerlendirilip, Sinovac aşısı ile benzer etkililiğe sahip olduğu sonucuna varılması nedeniyle, Acil Kullanım Onayı verilmiştir. mRNA aşısının uygulanmadığı durumlarda (aşıya erişmede güçlük, aşı içeriğine anafilaktik tipte alerjik yanıt, kişinin tercih etmemesi) inaktive virüs aşısı olarak SinoVac veya Turkovac'ın kullanılması düşünülebilir.