

KLİMİK DERNEĞİ'NDEN COVID-19'A KARŞI GÜNCEL BAĞIŞIKLAMA ÖNERİLERİ TABLOSU (10 Temmuz 2022)

SinoVac primer aşı şeması: 0, 1 ve 4. aylarda üç doz

BioNTech primer aşı şeması: 0 ve 1. aylarda iki doz

Primer aşı şeması yarım kalan kişilerin aşılamalarına kaldıkları yerden devam edilmesi, hatırlatma dozlarının primer şemanın tamamlanmasından en erken 3 ay sonra yapılması önerilir.

Öneri #	HANGİ DURUMDA?	KAÇINCI AYDA ? HANGİ AŞI ?							
	Kişinin Durumu	0. AY	1. AY	2. AY	3. AY	4. AY	5. AY	6. AY	7. AY
1	AŞISIZ	BioNTech	BioNTech			BioNTech			
15	AŞISIZ (immünsüpresif)	BioNTech	BioNTech	BioNTech			BioNTech*		
4	İki doz BioNTech				BioNTech				
5	Üç doz SinoVac				BioNTech				
6	İki doz SinoVac + Bir doz BioNTech				BioNTech				
7	İki doz SinoVac + iki doz BioNTech	Eldeki bilimsel veriler hatırlatma dozu için öneri yapmaya yeterli değildir.							
7	İki doz SinoVac + iki doz BioNTech (>50y, immünsüpresyon, altta yatan ciddi hastalık**, sağlık çalışanı)				BioNTech				
8	Üç doz BioNTech	Eldeki bilimsel veriler hatırlatma dozu için öneri yapmaya yeterli değildir.							
8	Üç doz BioNTech (>50y, immünsüpresyon, altta yatan ciddi hastalık**, sağlık çalışanı)				BioNTech				
16	Dört doz BioNTech veya 2 doz SinoVac üzerine 3 doz BioNTech	Eldeki bilimsel veriler hatırlatma dozu için öneri yapmaya yeterli değildir.							
9	Önceki varyantlarla hastalık (1 Ocak '22 öncesi) sonrası bir doz BioNTech	Hatırlatma dozu önerilmez. Yeni veriler ışığında değerlendirmek gerekir.							
10	Önceki varyantlarla hastalık (1 Ocak '22 öncesi) sonrası bir doz SinoVac				BioNTech				
11	İki doz BioNTech sonrasında COVID-19							BioNTech	
12	Aşısız/eksik aşılyken COVID-19 (1 Ocak '22 öncesi)				BioNTech				
13	Aşısız/eksik aşılyken COVID-19 (1 Ocak '22 sonrası)				BioNTech	BioNTech			
14	İki doz Sinovac + İki Doz BioNTech veya 3 doz BioNTech sonrasında COVID-19	Hatırlatma dozu önerilmez. Yeni veriler ışığında değerlendirmek gerekir.							
Biontech Uygulanamayan Durumlar (Aşıya erişmede güçlük, aşı içeriğine anafilaktik tipte alerjik yanıt, kişinin tercih etmemesi)									
2	AŞISIZ	İVA	İVA			İVA			İVA
12	Aşısız/eksik aşılyken COVID-19 (1 Ocak '22 öncesi)				İVA	İVA			İVA
13	Aşısız/eksik aşılyken COVID-19 (1 Ocak '22 sonrası)				İVA	İVA			İVA

İVA: İnaktif virüs aşısı

* Bağışıklık yetmezliği olan kişilerin inaktif aşı yerine mRNA aşıları ile aşılanmaları önerilir. Bu kişiler 1 ay arayla 3 dozdan (BioNTech) oluşan primer aşı şemasını tamamladıktan sonra ek dozların sayısı ve zamanlamasının belirlenmesi için Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına başvurmaları önerilir.

** Diyaliz hastaları, kalp yetmezliği, ileri akciğer yetmezliği ve siroz.

***İVA ile öncelikle DSÖ Acil Kullanım Listesinde olan ve ülkemizdeki çalışma sonuçları bilimsel kamuoyu ile paylaşılmış olan SinoVac kastedilmektedir. mRNA aşısının uygulanmadığı durumlarda (aşıya erişmede güçlük, aşı içeriğine anafilaktik tipte alerjik yanıt, kişinin tercih etmemesi) kullanılması düşünülebilir. Ülkemizde üretilen Turkovac aşısı, yapılan Faz III çalışmasının ara sonuçları, bilim insanlarından oluşan bir komitede değerlendirilip, Sinovac aşısı ile benzer etkililiğe sahip olduğu sonucuna varılması nedeniyle, Acil Kullanım Onayı verilerek kullanıma girmiştir. Daha güçlü öneride bulunabilmek için TurkoVac'ın farklı yaş gruplarındaki etkililik ve güvenlik verilerinin bilimsel kamuoyu ile paylaşılmasına ihtiyaç vardır.