

KRONİK BÖBREK HASTALARI İÇİN AŞI KONTROL LİSTESİ

1		İnfluenza (Grip) Her yıl uygulanmalıdır.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
			20.... TEK DOZ	20.... TEK DOZ	20.... TEL DOZ	20.... TEK DOZ	20.... TEK DOZ	20.... TEK DOZ
2		Hepatit B Anti-HBs <10 mIU/mL ise 3 doz (0, 1, 6 ay) uygulanmalıdır. Hemodiyaliz hastalarında ise 4 doz (0, 1, 2, 6. aylarda) her biri çift doz olacak şekilde uygulanmalıdır.	☐	☐	☐			
			0. AY 1.DOZ	1. AY 2.DOZ	6. AY 3.DOZ			
3		Hepatit A Bağışıklığı olmayan erişkinlerde 2 doz (6-12 ay arayla) uygulanmalıdır.	☐	☐				
			0. AY 1.DOZ	6-12. AY 2.DOZ				
4		Tetanos-Difteri-Boğmaca Primer aşılaması tamamlanmış ¹ erişkinler bir doz TdaB yapılmalı, her 10 yılda bir Td veya TdaB rapel doz uygulanmalıdır.	☐	☐	☐			
			20.... 1.DOZ	20.... 2.DOZ	20.... 3.DOZ			
5		Herpes Zoster ≥50 yaş ise, 2 doz (2-6 ay arayla) uygulanmalıdır.	☐	☐				
			0. HAFTA 1.DOZ	2-6. HAFTA 2.DOZ				
6		Respiratuar Sinsityal Virus (RSV) ≥75 yaş herkese veya şiddetli RSV riski yüksek olan ² 50-74 yaş arası yetişkinlere tek doz uygulanmalıdır.	☐	☐				
					TEK DOZ			
7		Pnömonokok Daha önce aşılanmamış ise ³ tek doz KPA20 uygulanmalıdır.	☐	☐				
					TEK DOZ			
8		Human Papilloma Virus (HPV) Daha önce aşılanmamış 45 yaş altındaki yetişkinlere 3 doz dokuz valan HPV aşısı (0, 1-2 ve 6. aylarda) uygulanmalıdır	☐	☐	☐			
			0. AY 1.DOZ	1-2. AY 2.DOZ	6. AY 3.DOZ			
9		COVID-19 En az bir doz güncellenmiş COVID-19 aşısı ile rapel doz önerilir.	☐	☐				
					TEK DOZ			

- 3 dozluk primer aşılama (1 doz TdaB, 4 hafta sonra Td veya TdaB, 6-12 ay sonra Td veya TdaB); primer aşılama eksiğe eksik aşıların tamamlanması önerilir.
- Kronik kalp veya kronik akciğer hastalığı olanlar, immünsüpresif hastalar ve bakımevi hastaları şiddetli RSV açısından riskli gruptadır.
- Daha önce sadece KPA13 veya PPA23 yapılmışsa ve üzerinden bir yıl geçmişse tek doz KPA20 önerilir. Daha önce KPA13 ve PPA23 yapılmışsa; koklear implant, BOS kaçağı varsa son pnömonokok aşısının üzerinden en az 5 yıl geçtikten sonra tek doz KPA20 önerilir.

