

SOLİD ORGAN TRANSPLANTLI HASTALARI İÇİN AŞI KONTROL LİSTESİ

1		İnfluenza (Grip) Her yıl uygulanmalıdır.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
			20.... TEK DOZ	20.... TEK DOZ	20.... TEK DOZ	20.... TEK DOZ	20.... TEK DOZ	20.... TEK DOZ
2		Hepatit B Anti-HBs <10 mIU/mL ise 0, 1,2, 6. aylarda her biri çift doz olacak şekilde uygulanmalıdır.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
			0. AY 2.DOZ	1. AY 1.DOZ	2. AY 2.DOZ	6. AY 3.DOZ		
3		Hepatit A Bağışıklığı olmayan erişkinlerde 2 doz (6-12 ay arayla) uygulanmalıdır.			☐	☐	☐	☐
					0. AY 1.DOZ	6-12. AY 2.DOZ		
4		Tetanos-Difteri-Boğmaca Primer aşılaması tamamlanmış ¹ erişkinler bir doz TdaB yapılmalı, her 10 yılda bir Td veya TdaB rapel doz uygulanmalıdır.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
			20.... 1.DOZ	20.... 2.DOZ	20.... 3.DOZ			
5		Herpes Zoster >18 yaş üstü ise 2 doz (0 ve 2-6 ay arası) uygulanmalıdır. ²			☐	☐	☐	☐
					0. AY 1.DOZ	2-6. AY 2.DOZ		
6		Respiratuar Sinsityal Virus (RSV) ≥50 yaş ise tek doz uygulanmalıdır.					☐	☐
							TEK DOZ	
7		Pnömonokok Daha önce aşılanmamış ise ³ tek doz KPA20 uygulanmalıdır.					☐	☐
							TEK DOZ	
8		Human Papilloma Virus (HPV) Daha önce aşılanmamış 45 yaş altındaki yetişkinlere 3 doz dokuz valan HPV aşısı (0, 1-2 ve 6. aylarda) uygulanmalıdır	☐	☐	☐	☐	☐	☐
			0. AY 1.DOZ	1-2. AY 2.DOZ	6. AY 3.DOZ			

DEVAM EDİYOR



- 3 dozluk primer aşılama (1 doz TdaB, 4 hafta sonra Td veya TdaB, 6-12 ay sonra Td veya TdaB); primer aşılama eksikse eksik aşıların tamamlanması önerilir.
- Aşılama mümkünse immün sistem baskılanmadan önce yapılmalıdır; değilse en güçlü bağışıklık yanıtının alınacağı dönemde planlanmalıdır. İmmünsüpresif tedavi planlanan ve hızlı bağışıklanma istenen hastalarda 1 ay arayla 2 doz uygulanabilir.
- Daha önce sadece KPA13 veya PPA23 yapılmışsa ve üzerinden bir yıl geçmişse tek doz KPA20 önerilir. KPA13 ve PPA23 uygulanmışsa, ≥65 yaş ise son aşı dozundan ≥5 yıl sonra tek doz KPA20 veya tek doz PPA23 önerilir.



EBÇG KLİMİK DERNEĞİ ERİŞKİN
BAĞIŞIKLAMASI ÇALIŞMA GRUBU

SOLİD ORGAN TRANSPLANTLI HASTALARI İÇİN AŞI KONTROL LİSTESİ

9



Haemophilus Influenzae Tip b (Hib)

Tercihen transplanttan 2 hafta önce veya nakilde 3-6 ay sonra tek doz uygulanmalıdır.



TEK
DOZ

10



Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK)

Seronegatifse transplantasyondan en az 1 ay önce 4 hafta arayla uygulanan 2 doz tamamlanmalıdır



0. HAFTA
1.DOZ



4. HAFTA
2.DOZ

11



Suçiçeği (Varisella)

Seronegatifse transplantasyondan en az 1 ay önce 4 hafta arayla uygulanan 2 doz tamamlanmalıdır.



0. HAFTA
1.DOZ



4. HAFTA
2.DOZ

12



COVID-19

En az bir doz güncellenmiş COVID-19 aşısı ile rapel doz önerilir.



TEK
DOZ



EBÇG KLİMİK DERNEĞİ ERİŞKİN
BAĞIŞIKLAMASI ÇALIŞMA GRUBU

www.klimik.org.tr