SOLİD ORGAN TRANSPLANTLI HASTALARI İÇİN
AŞI KONTROL LİSTESİ

1 

İnfluenza (Grip)
Yüksek doz influenza aşısı, her yıl uygulanmalıdır.

☐ 20.... TEK DOZ ☐ 20.... TEK DOZ ☐ 20.... TEK DOZ ☐ 20.... TEK DOZ ☐ 20.... TEK DOZ ☐ 20.... TEK DOZ

2 

Hepatit B
Anti-HBs <10 mIU/mL ise 0, 1,2, 6. aylarda her biri çift doz olacak şekilde uygulanmalıdır.

☐ 0. AY 2.DOZ ☐ 1. AY 1.DOZ ☐ 2. AY 2.DOZ ☐ 6. AY 3.DOZ

3 


Hepatit A
Bağışıklığı olmayan erişkinlerde 2 doz (6–12 ay arayla) uygulanmalıdır.

☐ 0. AY 1.DOZ ☐ 6.-12. AY 2.DOZ

4 

Tetanos-Difteri-Boğmaca
Primer aşılaması tamamlanmış[1] erişkinler bir doz Tdab yapılmalı, her 10 yılda bir Td veya Tdab rapel doz uygulanmalıdır.

☐ 20.... 1.DOZ ☐ 20.... 2.DOZ ☐ 20.... 3.DOZ

5 


Herpes Zoster
>18 yaş üstü ise 2 doz (0 ve 2-6 ay arası) uygulanmalıdır.[2]

☐ 0. AY 1.DOZ ☐ 2-6. AY 2.DOZ

6 


Respiratuar Sinsityal Virus (RSV)
≥50 yaş ise tek doz uygulanmalıdır.

☐ TEK DOZ

7 

Pnömokok
Daha önce aşılanmamış ise [3] tek doz KPA20 uygulanmalıdır.

☐ TEK DOZ

8 

Human Papilloma Virusu (HPV)
Daha önce aşılanmamış 45 yaş altındaki yetişkinlere 3 doz dokuz valan HPV aşısı (0, 1-2 ve 6. aylarda) uygulanmalıdır

☐ 0. AY 1.DOZ ☐ 1-2. AY 2.DOZ ☐ 6. AY 3.DOZ

DEVAM EDİYOR

1 3 dozluk primer aşılama (1 doz Tdab, 4 hafta sonra Td veya Tdab, 6-12 ay sonra Td veya Tdab); primer aşılama eksikse eksik aşıların tamamlanması önerilir.

2 Aşılama mümkünse immün sistem baskılanmadan önce yapılmalıdır; değilse en güçlü bağışıklık yanıtının alınacağı dönemde planlanmalıdır. İmmünsüpresif tedavi planlanan ve hızlı bağışıklanma istenen hastalarda 1 ay arayla 2 doz uygulanabilir.

3 Daha önce sadece KPA13 veya PPA23 yapılmışsa ve üzerinden bir yıl geçmişse tek doz KPA20 önerilir. KPA13 ve PPA23 uygulanmışsa, ≥65 yaş ise son aşı dozundan ≥5 yıl sonra tek doz KPA20 veya tek doz PPA23 önerilir.

EBÇG KLİMİK DERNEĞİ ERİŞKİN BAĞIŞIKLAMASI ÇALIŞMA GRUBU

SOLİD ORGAN TRANSPLANTLI HASTALARI İÇİN
AŞI KONTROL LİSTESİ

9 

Haemophilus İnfluenzae Tip b (Hib)
Tercihen transplanttan 2 hafta önce veya nakilde 3-6 ay sonra tek doz uygulanmalıdır.

☐ TEK DOZ

10 

Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK)
Seronegatifse transplantasyondan en az 1 ay önce 4 hafta arayla uygulanan 2 doz tamamlanmalıdır

☐ 0. HAFTA 1.DOZ ☐ 4. HAFTA 2.DOZ

11 

Suçiçeği (Varisella)
Seronegatifse transplantasyondan en az 1 ay önce 4 hafta arayla uygulanan 2 doz tamamlanmalıdır.

☐ 0. HAFTA 1.DOZ ☐ 4. HAFTA 2.DOZ

12 

COVID-19
En az bir doz güncellenmiş COVID-19 aşısı ile rapel doz önerilir.

☐ TEK DOZ